



**Centrum VetHouse Przychodnia Weterynaryjna  
i Szpital dla Zwierząt**

Poselska 1  
95-070 Rąbień  
Telefon: 42 235 17 05  
E-mail: info@centrumvethouse.pl

#### Właściciel

##### FUNDACJA "AZYL"

Aleja T. Kościuszki 1  
90-418 Łódź

Telefon: 691 799 579 Piotr, 669-70-50-10 Anna

Lekarz prowadzący: Radosław Owczarek

#### Zwierzę

##### Puszysta

Gatunek: Pies  
Rasa: Mieszaniec  
Płeć: samica  
Wiek: 2 lata i 8 miesięcy  
Oznakowanie:  
Maść: czarna

## Karta informacyjna wizyty

08/09/2020 14:16: BADANIE

#### OPIS WYWIADU

Po opieką fundacji od 3 tygodni. Przejęta z hodowli gdzie u kilku innych psów były zaburzenia rozwojowe dot. układu ruchu. Nie jest w stanie normalnie chodzić na kończynach miednicznych.

#### OPIS BADANIA

Przemieszcza się an kończynach piersiowych kończyny miedniczne podciągając pod brzuch wykonując nimi niewielkie ruchy naprzemienne. Kończyny miedniczne w bardzo silnym zgięciu stawów biodrowych, kolanowych, mniejszym stopniu skokowych. Miednica podczas chodzenia we fleksji - podciągnięta pod brzuch.

W badaniu w znieczuleniu ogólnym ruchomość stawów biodrowych, skokowych, stawów stopy prawidłowe. Ruchomość w stawach kolanowych bardzo zaburzona - ograniczony wyprost, rotacje zewnętrzne podudzi, podwichnięcie stawów udowo-piszczelowych, zwichnięcie rzepek na stronę boczną - IV stopnia.

Ze względu na brak możliwości ułożenia kończyn miednicznych do badania RTG w znieczuleniu w pozycji zbliżonej do fizjologicznej - co pozwoliłoby wstępnie ocenić patologię - wykonano badanie tomograficzne. Badanie dotyczyło kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, miednicy, kończyn miednicznych. Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym odcinku kręgosłupa. Widoczna patologia kości udowych w postaci zwiększonej antewersji szyjek kości udowych, co najpewniej jest przyczyną zaburzeń rozwojowych kolan. Zaburzenia osiowe trzonów kości udowych. Patologia końców dalszych - szpotawość, niewykształcony bloczek kości udowych, podwichnięcie stawów udowo-piszczelowych, zwichnięcie rzepek IV stopnia. Koślawość końców bliższych kości piszczelowych z ich silną zewnętrzną rotacją.

Stawy skokowe i stóp ujęte w badaniu bez patologii.

#### ZABIEGI

Założenie venflonu  
TK

#### ZASTOSOWANE LEKI

TORPHADINE VET 10 MG/ML FIOŁKA - 10 ML 0,2	ml
Sedazin 20mg/ml 50ml	1 ml
Sposób podania: Iniekcja domięśniowa	
Midanium 15mg/3ml amp.	0,2 ampułka
Sposób podania: Dożylnie	
Plofed 1% 10mg/ml	5 ml
Sposób podania: Dożylnie	

Historia wizyt

Natrium Chlor 0,9% 10ml, 100amp	1	ampułka	
Sposób podania: Dożylnie			
Strzykawka 2ml	1	sztuca	
Kompresy Gaz. Niejał. 10x10cm	0,05	opakowanie	
Venflon standard	1	sztuca	
Plaster Omnisilk 5cm	0,1	sztuca	
Opaska No Chew Kruise 4,5cm/7,5cm/10cm	0,1	sztuca	
Opaska Fun-Flex 5cm/7,5cm/10cm	0,1	sztuca	
Mikroprobówka 1,3ml z heparyną litową 100szt	1	sztuca	
Plaster Omnisilk 2,5cm	0,1	sztuca	
Cewnik Foley 12FR/5-10ml	1	sztuca	
Worek moczowy 150cm	1	sztuca	

 **ZALECENIA**

---

Leczenie opercyjne złożonej wady stawów kolanowych.

Prawy staw: transpozycja guzowatości kości piszczelowej, wytworzenie bloczka kości udowej

Lewy staw: osteotomia korekcyjna nasady dalszej kości udowej, osteotomia poziomująca nasady bliższej kości piszczelowej (TPLO) z korektą zaburzenia osiowego i koślawości. Wytworzenie bloczka kości udowej.

 Zarejestrował: Radosław Owczarek

---

\_\_\_\_\_  
Podpis lekarza weterynarii