



**Centrum VetHouse Przychodnia Weterynaryjna
i Szpital dla Zwierząt**

Poselska 1
95-070 Rąbień
Telefon: 42 235 17 05
E-mail: info@centrumvethouse.pl

Właściciel

Wróblak Elżbieta

Rajdowa 10
94-003 Łódź

Telefon: 660 479 595

Lekarz prowadzący: Radosław Owczarek

Zwierzę

Rudek

Gatunek: Pies

Rasa: Mieszaniec

Płeć: samiec

Wiek: 11 miesięcy

Oznakowanie:

Maść: ruda

Historia wizyt

11/08/2020 15:51: **BADANIE**

OPIS WYWIADU

konsultacja ortopedyczna

OPIS BADANIA

Piesek po adopcji z Fundacji AZYL.

Odebrany z hodowli.

Diagnoza: Wada rozwojowa dotyczą kości przedramion - lewego i prawego. Obustronny syndrom krótkiej kości łokciowej, krzywej promieniowej z podwichnięciem stawów ramienno-łokciowych, oraz bardzo nasiloną koślawością i pronacją dłoni.

ZABIEGI

Wizyta

Premedykacja

Założenie venflonu

Zdjęcie RTG 3

ZASTOSOWANE LEKI

Oślonka na termometr	1	sztuka
Natrium Chlor 0,9% 10ml, 100amp	1	ampułka
Sposób podania: Dożylnie		
Strzykawka 2ml	1	sztuka
Kompresy Gaz. Niejał. 10x10cm	0,05	opakowanie
Venflon standard	1	sztuka
Plaster Omnisilk 5cm	0,1	sztuka
Opaska No Chew Kruuse 4,5cm/7,5cm/10cm	0,1	sztuka
Opaska Fun-Flex 5cm/7,5cm/10cm	0,1	sztuka
Mikroprobówka 1,3ml z heparyną litową 100szt	1	sztuka
Plaster Omnisilk 2,5cm	0,1	sztuka
TORPHADINE VET 10 MG/ML FIOŁKA - 10 ML	0,1	ml
Sedazin 20mg/ml 50ml	0,6	ml
Sposób podania: Iniekcja domięśniowa		
Midanium 15mg/3ml amp.	0,05	ampułka
Sposób podania: Dożylnie		
Plofed 1% 10mg/ml	1	ml
Sposób podania: Dożylnie		
Antisedan 5mg/ml 10ml butelka	0,1	ml

Rękawice Nitrylowe Bezpudrowe M 0,1 opakowanie

 **ZALECENIA**

Wskazane operacyjne skorygowanie wady.

 Zarejestrował: Radosław Owczarek**25/08/2020 09:21: BADANIE** **OPIS BADANIA**

Osteotomia korekcyjna wielopłaszczyznowa kości promieniowej lewej z korektą osiową przedramienia, osteotomia dynamiczna kości łokciowej lewej.

 **ZABIEGI**

Założenie venflonu

Zabieg duży

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Synulox Inj. 140mg+35mg 100ml	0,4	ml		
Sposób podania: Iniekcja domięśniowa				
Natrium Chlor 0,9% 10ml, 100amp	1	ampułka		
Sposób podania: Dożylnie				
Strzykawka 2ml	1	sztuka		
Kompresy Gaz. Niejał. 10x10cm	0,05	opakowanie		
Venflon standard	1	sztuka		
Plaster Omnisilk 5cm	0,1	sztuka		
Opaska No Chew Kruise 4,5cm/7,5cm/10cm	0,1	sztuka		
Opaska Fun-Flex 5cm/7,5cm/10cm	0,1	sztuka		
Mikropróbówka 1,3ml z heparyną litową 100szt	1	sztuka		
Plaster Omnisilk 2,5cm	0,1	sztuka		
Linco-Spectin 50mg+100mg 100ml	1,5	ml		
Sposób podania: Iniekcja domięśniowa				
TORPHADINE VET 10 MG/ML FIOŁKA - 10 ML	0,15	ml		
Sedazin 20mg/ml 50ml	1	ml		
Sposób podania: Iniekcja domięśniowa				
Midanium 15mg/3ml amp.	0,1	ampułka		
Sposób podania: Dożylnie				
Ketamidol rozł. do wstrz.. 100 MG/ML FIOŁKA - 50 ML	1	ml		
Plofed 1% 10mg/ml	3	ml		
Sposób podania: Dożylnie				
Podkład chłonny 60x90	7	sztuka		
Pole Operacyjne 100x150cm	2	sztuka		
Opaska Fun-Flex 5cm/7,5cm/10cm	2	sztuka		
Rękawice jałowe roz. 6,5	1	opakowanie		
Rękawice jałowe roz. 8	1	opakowanie		
Rękawice Lateksowe Bezpudrowe Abena M	0,25	opakowanie		
Natrium Chloratum 0,9% 500ml	1	opakowanie		
Sposób podania: Dożylnie				
Przyrząd Do Przetaczania	1	sztuka		
Przedłużacz Do Pomp 150cm	1	sztuka		
Płytki T-TPLO 2.4 L41_SS	1	sztuka		
Wkręt korowy samogwintujący 2,4 od 8 do 26mm SS	7	sztuka		
Monosyn 3-0 HR22 70 CM	1	sztuka		
Kołnierz 15cm	1	sztuka		
Opaska podtr. Peha-Crepp 6-12cm x 4m	1	sztuka		

 **WYDRUKI W TRAKCIE WIZYTY**

ZGODA NA OPERACJĘ/ZABIEG

Rozpoznanie/podejrzanie::

Rodzaj wykonywanego zabiegu:: Oświadczam, że zastosowałem się do zalecanej dla zwierzęcia głódówki.

 Zarejestrował: Radosław Owczarek

25/08/2020 18:37: WIZYTA

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Amitryptylinum VP 10mg tabl.powl. 60szt 6 tabletki
 Sposób podania: Doustnie
 Gabapentin 300mg 100kaps. 1 kapsułka
 Animonda 100g 1 tacka

 Zarejestrował: Radosław Owczarek

26/08/2020 09:15: WIZYTA

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Animonda 100g 1 tacka

 Zarejestrował: Radosław Owczarek

26/08/2020 12:36: WIZYTA

 **ZABIEGI**

Hospitalizacja indywidualna

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Podkład chłonny 60x90 6 sztuka
 Lignina Płaty 5kg 0,05 opakowanie
 Opaska podtrz. Peha-Crepp 6-12cm x 4m 0,5 sztuka
 Rękawice Lateksowe Bezpurowe Abena M 0,2 opakowanie
 Linco-Spectin 50mg+100mg 100ml 1,5 ml
 Sposób podania: Iniekcja domięśniowa
 Synulox Inj. 140mg+35mg 100ml 0,4 ml
 Sposób podania: Iniekcja domięśniowa
 Gabapentin 100mg 100kaps. 10 kapsułka
 Synulox Tabl. 250mg 8 tabletki
 Sposób podania: Doustnie
 Zodon tabl. do żucia 264mg - 6 tabl. 4 tabletki
 Cimalgex tabl. do żucia 8mg 32tabl. 8 tabletki

 **ZALECENIA**

zalecono maksymalne ograniczenie ruchu- spacery pod kontrolą, na smyczy, jeżeli Rudek nie będzie chodził na operowanej kończynie - ćwiczymy delikatnie zginanie i prostowanie stawów

Zwierzę w okresie rekonwalescencji powinno stale być ubrane w wydany po zabiegu kołnierz lub ubranko, które ma zapobiec wylizywaniu rany i zdjęciu szwów, a także jej zabrudzeniu np. na spacerze. Nie stanowi to przeszkody w spaniu, jedzeniu czy załatwianiu potrzeb fizjologicznych. Rudek powinien chodzić w kołnierzu przez 10 dni po zabiegu.

O ile nie zalecono, rana pooperacyjna nie wymaga pielęgnacji, okolicę należy jednak obserwować pod kątem obrzęku, zaczerwienienia, zwiększonej ciepłoty i wysięku.

LEKI DO PODANIA W DOMU:

Historia wizyt

_synulox 1/2 tabl co 12 h _____


_zodon 1/4 tabl co 12 h _____

_cimalgex 1,5 tabl co 24 h rano _____

na wyciszenie można podawać gabapentin 1/2 kaps co 12 h oraz amitryptylina 1/2 tabl co 12-24 h

KONTROLA POZABIEGOWA:

DATA: ___ 1.09.2020 _____ GODZ: _____

 Zarejestrowała: lek. wet. Małgorzata Bulska

01/09/2020 09:35: BADANIE

 **OPIS WYWIADU**

Samopoczucie ogólne dobre, apetyt zachowany
Zaczyna obciążać operowaną kończynę
Rana pooperacyjna sucha, goi się prawidłowo
Kończyna nieznacznie obrzęknięta

 **ZABIEGI**

[Wizyta kolejna](#)

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Rękawice Lateksowe Bezpudrowe Abena M	0,1	opakowanie
Zodon tabl. do żucia 264mg - 6 tabl.	3	tabletki
Synulox Tabl. 250mg	6	tabletki
Sposób podania: Doustnie		
Cimalgex tabl. do żucia 8mg 32tabl.	6	tabletki

 Zarejestrował: Błażej Duda

08/09/2020 09:35: WIZYTA

 **OPIS WYWIADU**

Rudek kontrola

 **ZABIEGI**

[Wizyta kontynuacja](#)

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Cimalgex tabl. do żucia 8mg 32tabl.	6	tabletki
-------------------------------------	---	----------

 Zarejestrował: Błażej Duda

17/09/2020 08:57: BADANIE

 **OPIS BADANIA**

Osteotomia korekcyjna wielopłaszczyznowa kości promieniowej prawej z korektą osiową przedramienia, osteotomia dynamiczna kości łokciowej lewej.

 **ZABIEGI**

Założenie venflonu
Zabieg duży

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Synulox Inj. 140mg+35mg 100ml	0,4	ml		
Sposób podania: Iniekcja domięśniowa				
Natrium Chlor 0,9% 10ml, 100amp	1	ampułka		
Sposób podania: Dożylnie				
Strzykawka 2ml	1	sztuka		
Kompresy Gaz. Niejał. 10x10cm	0,05	opakowanie		
Venflon standard	1	sztuka		
Plaster Omnisilk 5cm	0,1	sztuka		
Opaska No Chew Kruise 4,5cm/7,5cm/10cm	0,1	sztuka		
Opaska Fun-Flex 5cm/7,5cm/10cm	0,1	sztuka		
Mikroprobówka 1,3ml z heparyną litową 100szt	1	sztuka		
Plaster Omnisilk 2,5cm	0,1	sztuka		
Linco-Spectin 50mg+100mg 100ml	1,5	ml		
Sposób podania: Iniekcja domięśniowa				
TORPHADINE VET 10 MG/ML FIOŁKA - 10 ML	0,15	ml		
Sedazin 20mg/ml 50ml	1	ml		
Sposób podania: Iniekcja domięśniowa				
Midanium 15mg/3ml amp.	0,1	ampułka		
Sposób podania: Dożylnie				
Plofed 1% 10mg/ml	3	ml		
Sposób podania: Dożylnie				
Podkład chłonny 60x90	7	sztuka		
Pole Operacyjne 100x150cm	2	sztuka		
Opaska Fun-Flex 5cm/7,5cm/10cm	2	sztuka		
Rękawice jałowe rozm. 6,5	1	opakowanie		
Rękawice jałowe rozm. 8	1	opakowanie		
Natrium Chloratum 0,9% 500ml	1	opakowanie		
Sposób podania: Dożylnie				
Przyrząd Do Przetaczania	1	sztuka		
Przedłużacz Do Pomp 150cm	1	sztuka		
Płytki T-TPLO 2.4 L41_SS	1	sztuka		
Wkręt korowy samogwintujący 2,4 od 8 do 26mm SS	7	sztuka		
Monosyn 3-0 HR22 70 CM	1	sztuka		
Kołnierz 15cm	1	sztuka		
Opaska podtrz. Peha-Crepp 6-12cm x 4m	1	sztuka		
Natrium Chlor 0,9% 10ml, 100amp	20	ampułka		
Sposób podania: Dożylnie				
Rękawice jałowe rozm. 8	1	sztuka		
Rękawice Lateksowe Pudrowane XS	0,25	opakowanie		
Fartuch jałowy jednorazowy	2	sztuka		
NARKAMON ROZT.DO WSTRZ. 100 MG/ML FIOŁKA - 50 ML	0,6	ml		
Iso-Vet Izofluran 1000mg/g 250ml	15	ml		
Sposób podania: Wziewnie				
Zestaw do odsysania pola operacyjnego Yankauer	2	sztuka		

 **WYDRUKI W TRAKCIE WIZYTY**

ZGODA NA OPERACJĘ/ZABIEG

Rozpoznanie/podejrzanie::

Rodzaj wykonywanego zabiegu:: osteotomia korekcyjna przedramienia prawego Oświadczam, że zastosowałem się do zalecanej dla zwierzęcia głodówki.

 Zarejestrował: Radosław Owczarek

18/09/2020 12:38: WIZYTA

 **ZABIEGI**

Hospitalizacja indywidualna

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Podkład chłonny 60x90	6	szuka
Lignina Płaty 5kg	0,05	opakowanie
Opaska podtrz. Peha-Crepp 6-12cm x 4m	0,5	szuka
Rękawice Lateksowe Bezpułdrowe Abena M	0,2	opakowanie
Animonda czarna 800g	1	puszka
Synulox Inj. 140mg+35mg 100ml	0,4	ml
Sposób podania: Iniekcja domięśniowa		
Linco-Spectin 50mg+100mg 100ml	1,5	ml
Sposób podania: Iniekcja domięśniowa		

 Zarejestrowała: lek.wet. Joanna Cieślak

19/09/2020 10:08: WIZYTA

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Synulox Tabl. 500mg	4	tabletki
Sposób podania: Doustnie		
Clindamycin MIP 300mg, tabl. powł. 16szt.	4	tabletki
Sposób podania: Doustnie		

 **ZALECENIA**

Przez 4 tygodnie ograniczamy ruch, spacerujemy tylko na smyczy, pod kontrolą, staramy się aby Rudek nie obciążał nadmiernie operowanej kończyny

Zwierzę w okresie rekonwalescencji powinno stale być ubrane w wydany po zabiegu kołnierz lub ubranko, które ma zapobiec wylizywaniu rany i zdjęciu szwów, a także jej zabrudzeniu np. na spacerze. Nie stanowi to przeszkody w spaniu, jedzeniu czy załatwianiu potrzeb fizjologicznych. Rudek powinien chodzić w kołnierzu przez 10 dni od zabiegu.


O ile nie zalecono, rana pooperacyjna nie wymaga pielęgnacji, okolicę należy jednak obserwować pod kątem obrzęku, zaczerwienienia, zwiększonej ciepłoty i wysięku.

LEKI DO PODANIA W DOMU od Nd rano:


synulox 1/4 tabl co 12 h

clindamycin 1/4 tabl co 12 h

KONTROLA POZABIEGOWA:

DATA: 24.09 GODZ: _____ Zarejestrowała: lek. wet. Małgorzata Bulska

22/09/2020 09:22: WIZYTA

 Zarejestrował: Radosław Owczarek

Podpis lekarza weterynarii