



Tomasz Sobieraj
Klinika Weterynaryjna BRACI MNIEJSZYCH
ul. Jana Pawła II 37

95-050 Konstantynów Łódzki
Telefon: (042) 211-11-03
E-mail: biuro@klinikabm.pl

Zwierzę

Czarny 11.09.2024

Gatunek: Kot
Rasa: FELIX DOME
Płeć: samiec
Wiek: tygodni: 7
Oznakow.:
Maść: czarna
Waga: 0,6 kg

Właściciel

Fundacja Azyl

Kościuszki 1
90-418 Łódź

Telefon: 691 799 579 Anna Job, 669 70 50 10 Anna
E-mail: fundacja.azyl@interia.pl

Historia wizyt

11/09/2024 02:02: WIZYTA

OPIS WYWIADU

brzydki czarny kał. nie chce jeść, w fundacji od dwóch dni

ZABIEGI

WIZYTA PIERWSZA
MATERIAŁY
INIEKCJA 2
PZD
USG AFAST/TFAST

ZASTOSOWANE LEKI

TEST Vetexpert FPV/FCOV/Giardia AG 1 szt.
Enterozoo żel detoksykacyjny 100 g tuba 1 tuba
Flora balance mini 30 caps. 30 caps.
Augmentin 457mg/5ml pr.do sporz.zaw.35ml 1 op.
Sposób podania: Doustnie
Fenbendazol żel na dawki 1 ml 1,5 1ml.
Synulox RTU 100 ml na ml 0,03 ml
Sposób podania: Iniekcja podskórna
Espumisan Krople 100 mg/ml 30 ml 1 ml

ZALECENIA

W domu od poranka 11.09

Flora balance mini - 1 kaps x 1 dziennie przez cały miesiąc
Enterozoo - pasta detoksykacyjna - pomaga przy brzydkim i biegunkach - 1/2 łyżeczki od herbaty - 2 x dziennie
Pasta fenbendazol na odrobaczenia przez kolejnych 5 dni - 1 strzykawka x 1 dziennie -rano

Od wieczora 11.09 dodatkowo
Augmentin antybiotyk - 0,07 ml x 2 dziennie -rano i wieczorem przez kolejnych 5 dni

W związku z tym że mamy do czynienia w teście płytkowym z giardia intestinalis - wskazane jest odrobaczenie przez 5 kolejnych dni pastą fenbedazol
- Separujemy czarną od pozostałych kotów
- Podajemy leki w rękawiczkach
- Od razu po kontakcie z czarną myjemy ręce aby nie przenosić potencjalnie pierwotniaka z rodziny giardia - na pozostałe zwierzęta

Historia wizyt

- Podajemy probiotyk przez 30 dni
- Przez okres 5 dni minimum raz dziennie - czystymy odbyt i okolicę odbytu - chusteczką nasączoną szarym mydłem

W przypadku czarnej 2 tygodnia od zakończenia odrobaczania wskazana zbiórka kału
Przez 3 dni - zbieramy do 1 pojemnika po około 1 gramie kału - przynosimy do lecznicy - panel średni animallab - nazwa badania

Wskazana zbiórka kału

21/09/2024 08:45: BADANIE I DIAGNOSTYKA

Temperatura: 39,1°C
Waga: 0,45 kg

OPIS WYWIADU

pogorszenie
była poprawa po leczeniu
wczoraj wizyta w innym ZLZ bo pogorszenie- gorszy kał, bez wymiotów
dzisiaj jeszcze luźniejszy kał+ wymioty

WYNIKI BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

Icxx ProCyte DX

PARAMETR	WARTOŚĆ	=	J.M.	MIN	MAX	
RBC	8,27		M/μL	6,54	12,2	
HCT	36,1		%	30,3	52,3	
HGB	10,6		g/dl	9,8	16,2	
MCV	43,7		fL	35,9	53,1	
MCH	12,8		pg	11,8	17,3	
MCHC	29,4		g/dl	28,1	35,8	
RDW	27,6		%	15	27	
RETIC%	0,3		%			
RETIC	23		K/μL	3	50	
WBC	29,81		K/μL	2,87	17,02	
NEU%	* 62,9	*	%			
MONO%	* 4,9	*	%			
EOS%	5,1		%			
BASO%	0		%			
Limfocyty	* 8,09	*	K/μL	0,92	6,88	
Limfocyty%	* 27,1	*	%			
Monocyty	* 1,46	*	K/μL	0,05	0,67	
Eozynofile	1,51		K/μL	0,17	1,57	
Bazofile	0		K/μL	0,01	0,26	
PLT (Trombocyty)	1263		K/μL	151	600	
MPV	16,5		fL	11,4	21,6	
PCT	2,08		%	0,17	0,86	
NEU	* 18,75	*	K/μL	2,3	10,29	
INSTR_NOTES	* Potwierdź za pomocą wykresu dot plot i/lub badania rozmazu krwi. Prawdopodobieństwo obecności neutrofilii niedojrzałych lub toksycznych – rozważyć stan zapalny.					
RETIC-HGB	18,7		pg	13,2	20,8	

BIOCHEMIA REFLOVET

PARAMETR	WARTOŚĆ	=	J.M.	MIN	MAX
Glukoza(pasek)	78		mg/dl	100	130

 **ZABIEGI**

WIZYTA PIERWSZA
MATERIAŁY
INIEKCJA 3
Badanie Animallab panel średni
MORFOLOGIA ProCyte IDEXX

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Linco-Spectin - 100 ml 0,1 ml
Sposób podania: Iniekcja podskórna
Prevomax rozt.do wstrz. 10 mg/ml 20 ml 0,08 ml
Sposób podania: Iniekcja podskórna
Pantoprazole 40mg fiołka 0,1 fiołka
Płyn Ringera Lactate 1000 ml 60 ml
Venflon G 26 (fioletowy) 0,6*19mm 1 szt.
Przedłużacz do pomp 1 szt.
Carobin Pet Forte pasta 30 g 0,1 op.
Podkład higieniczny 60x60 4 szt.
Royal cat gastrointestinal kitten 195 g1 op.
Flora care mini 30 kps. 10 kaps.

21/09/2024 15:37: BADANIE

 **OPIS BADANIA**

Samopoczucie dobre
Apetyt i pragnienie zachowane
mocz oddał
kału nie oddał
temp 38,9 st C


 **ZABIEGI**

Leczenie stacjonarne fundacyjne POPOŁUDNIOWE
MATERIAŁY

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Carobin Pet Forte pasta 30 g 0,016 op.

21/09/2024 16:30: WIZYTA

		Date Laboratorium Weterynar 93-219 Łódź, ul. T mail: wyniki@
Właściciel: FUNDACJA AZYL Zwierzę: Kot, Czarny, 6 tyg, Samiec Jednostka kierująca: KLINIKA BRACI MNIEJSZYCH SPRAWOZDANIE Z BADAŃ LABORATORYJNYCH		
Parazytologia		
Badanie	Wynik	Jednostka
PASOŻYTY		
Pasożyty jelitowe	(+) w próbce/próbce zbiorczej kału zbadanej metodami metodami zagęszczającymi stwierdzono obecność jajek intestinalis, liczących oocysty Cryptosporidium felis	
Giardia (Ag)	(+) w badanej próbce/próbce zbiorczej kału stwierdzono koproantygen Giardia intestinalis	
Cryptosporidium (Ag)	(-) w badanej próbce/próbce zbiorczej kału nie stwierdzono koproantygeny Cryptosporidium spp.	
		Osoba wyk dr n. med. II specjalista w

22/09/2024 07:41: BADANIE**OPIS BADANIA**

Samopoczucie dobre
 Apetyt i pragnienie zachowane
 mocz oddał
 kał oddał luźny
 temp 38,7 st C

podano procox - po podaniu pacjent czuje sie dobrze

Do rozważenia jutro rozpoczęcia leczenia w kierunku giardii

ZABIEGI

Leczenie stacjonarne fundacyjne PORANNE
 MATERIAŁY

ZASTOSOWANE LEKI

Carobin Pet Forte	pasta 30 g	0,016	op.
Pantoprazole	40mg fiołka	0,002	fiołka
Linco-Spectin	- 100 ml	0,1	ml
Sposób podania: Iniekcja podskórna			
Procox	7,5 ml	0,25	ml
Sposób podania: Doustnie			

22/09/2024 11:55: ROZMOWA TELEFONICZNA

Opis rozmowy:

przekazałam informację na temat stanu zdrowia

22/09/2024 15:24: BADANIE

OPIS BADANIA

Samopoczucie bardzo dobre
Apetyt i pragnienie zachowane
mocz oddał
kał oddał
temp 37,2

ZABIEGI

Leczenie stacjonarne fundacyjne POPOŁUDNIOWE
MATERIAŁY

ZASTOSOWANE LEKI

Carobin Pet Forte pasta 30 g 0,016 op.

23/09/2024 12:46: BADANIE

OPIS BADANIA

samopoczucie bardzo dobre, zainteresowany otoczeniem
apetyt zachowany
oddaje mocz
temp. 37,9
Glc 188
elastyczność skóry lekko obniżona
brzuch miękki niebolesny

ZABIEGI

Leczenie stacjonarne fundacyjne PORANNE
MATERIAŁY
BADANIE GLUKOZY(GLUKOMETR)

ZASTOSOWANE LEKI

Prevomax rozt.do wstrz. 10 mg/ml 20 ml 0,04 ml
Sposób podania: Iniekcja podskórna
Pantoprazole 40mg fiołka 0,02 fiołka
Linco-Spectin - 100 ml 0,1 ml
Sposób podania: Iniekcja podskórna
Carobin Pet Forte pasta 30 g 0,05 op.
Diarsanyl 24 ml 0,05 szt.
Test pas. do glukometru ALPHATRACK 31 szt.
Royal cat gastrointestinal kitten 195 g1 op.

23/09/2024 16:00: BADANIE

Waga: 0,52 kg

OPIS BADANIA

samopoczucie bardzo dobre
apetyt zachowany
kał zwarty
Glc 112

podaję pierwszą dawkę fenbendazolu
kontynuacja przez kolejne 6 dni

kociak na razie zostaje w klinice- fundacja obawia się nagłego pogorszenia stanu zdrowia

 **ZABIEGI**

BADANIE GLUKOZY(GLUKOMETR)
POBYT DOBOWY 0,5

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Test pas. do glukometru ALPHATRACK 31 szt.
Fenbendazol żel na dawki 1 ml 0,25 1ml.
Podkład higieniczny 60x60 1 szt.
Pellet drzewny 15 kg 1 kg
Espumisan Krople 100 mg/ml 30 ml0,5 ml

 **ZALECENIA**

- * Fenbendazol 0,25ml 1xdziennie przez 7 kolejnych dni
- * probiotyk przez ok. miesiąc
- * antybiotyk

23/09/2024 16:45: WIZYTA

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Royal cat mother & babycat 0,4 kg 1 op.

24/09/2024 07:02: BADANIE

Temperatura: 38,0°C

 **OPIS BADANIA**

aktywny
ma apetyt i pragnienie

 **ZABIEGI**

MATERIAŁY
Pobyt dobowy 0,5

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Linco-Spectin - 100 ml 0,1 ml
Sposób podania: Iniekcja podskórna

24/09/2024 09:22: WIZYTA

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Royal cat gastrointestinal kitten 195 g1 op.

24/09/2024 15:14: BADANIE

 **OPIS BADANIA**

samopoczucie bardzo dobre, aktywny
apetyt zachowany
kał i mocz prawidłowo

ZABIEGI

Pobyt dobowy 0,5
MATERIAŁY

ZASTOSOWANE LEKI

Fenbendazol żel na dawki 1 ml 0,25 1ml.
Espumisan Krople 100 mg/ml 30 ml0,2 ml

25/09/2024 07:15: BADANIE

OPIS BADANIA

Wydano ze szpitala.

ZABIEGI

Pobyt dobowy 0,5

ZASTOSOWANE LEKI

Linco-Spectin - 100 ml 0,1 ml
Sposób podania: Iniekcja podskórna
Espumisan Krople 100 mg/ml 30 ml 0,2 ml

25/09/2024 08:48: WIZYTA

Waga: 0,6 kg

ZASTOSOWANE LEKI

Royal cat kitten 195 g 1 op.
VetoMune 60 kaps. 14 kaps.
Sposób podania: Doustnie
Linco-Spectin - 100 ml 0,2 ml
Sposób podania: Iniekcja podskórna
Dawkowanie: NA 2 PODANIA PO 0,1 ML
Flora balance mini 30 caps. 15 caps.

ZALECENIA

FENBENDAZOL 1 X DZIENNIE PO 0,3 ML DOUSTNIE PODAWAĆ OD 25.09 DO 29.09 WŁĄCZNIE .
FLORA MINI 1 X DZIENNIE ZAWARTOŚĆ 1 KAPS DO JEDZENIA RANO (PODAWAĆ MINIMUM 3 TYG)
LINCO-SPEXTIN 1 X DZIENNI 0,1 ML RANO PODAĆ W DNIU 26.09 ORAZ 27.09 I KONIEC .
VETOMUNE 1 X DZIENNIE ZAWARTOŚĆ 1 KAPS DO JEDZONKA RANO (PODAWAĆ 2 TYG)
W PRZYPADKU KIEDY KOCIAK BĘDZIE MIAŁ WZDĘTY BRZUCH MOŻNA PODAĆ ESPUMISAN PO 0,2 ML DOUSTNIE CO 6 H .

W DNIU 06.10.24 PODAĆ PROCOX ADEKWATNIE DO WAGI KOCIAKA .

OD 10.10 ROZPOCZĄĆ ZBIÓRKĘ KAŁU Z 3 DNI NA KONTROLNE BADANIE .

Podpis lekarza weterynarii